



D. O. M.

POSITIONES ANATOMICÆ

E T

CHIRURGICÆ.



SOLIDIS & fluidis conflare corpus humanum nemo nescit. Ex partibus solidis, aliæ molles, aliæ vero duræ; duras seu Ossa cæteris omnibus quasi fundamentum & fulcrum præbentes, innumeris affici læsionibus constat, ex quibus non nullis, nisi Chirurgiæ præsidio protinus debellarentur; brevi temporis spatio totius machinæ detrimentum enasceretur.

Ex omnibus morbis ossa afficientibus, alii contiguitatem, alii continuitatem lædunt; Luxatio, Anchilosis, Distortio, ligamentorum affectus & Diastasis contiguitatem; Fractura verò, Caries, Curvatura, Mollities, Exostosis & Nodus continuitatem ossis potissimum fauciare dicuntur.

UNUM ex his tanquam frequentiore, fracturam scilicet ; omnes inter eligendum nobis apparuit ; cum autem in longum nimis singularum protraheretur fracturarum descriptio, de cruris fracturâ tantum modò solliciti, quid quid ad rem spectat attingemus.

QUATUOR in partes extremitatem inferiorem, in Femur scilicet, Genu, Crus & Pedem dividimus ; at cum præsertim de Crure hic agendum incumbat, ipsius divisionem, compositionem & structuram, quantum in nobis erit, exponere conabimur.

SOLUTAM à causâ quâlibet contundente ossis continuitatem ; cum authoribus fracturam appellamus.

FRACTURARUM species aut differentias, tum ab ipsarum essentiâ, figurâ, ossium parte, tum deniquè ab accidentibus desumendas stabilierunt Chirurgiæ Antistites.

TIBIA & fibula, vel simul, vel separatim, in eodem diversive punctis, cum aut sine accidentibus effranguntur ; hinc in simplicem, compositam & complicatam dividi solet fractura.

MODò transversè, modò obliquè, modò partim obliquè, partim transversè, quandoquè etiam comminutum, & juxta quoddam fissuræ ad-instar effranguntur ossa, indè varia sortiuntur fracturæ nomina.

EXTERNAS fracturarum causas tanquam efficientes admittimus, ictus nempe, lapsus, nixus, & quæcumque ossa dissumpere & collidere possunt ; internæ tamen ut remotæ & prædisponentes apud omnes spectari solent. *

FRACTURARUM signa alia æquivoca, alia certa ; æquivoca ex dolore & motûs impotentiâ ; certa verò ex auditû, visû & tactû, seorsim aut simul sumpta oriri perspicuum est.

IN primitiva & consecutiva fracturarum Cruris accidentia ordinantur ; primitiva in Dolore vehementi, Vulnere, & Hemorrhagiâ ; consecutiva in Convulsione, Pruritû, Febre, Inflammatione,

• Vide inter alias Observationem celeb. Saviardi LXII, pag. 274.

Abscessû , Gangrenâ , Paralysi , Atrophîâ , Anchilosi , Calli & partis deformitate consistere neminem latet.

PROGNOSIM fracturarum , pro simplicitate , compositione , complicatione , figurâ , sitû , ægri ætate & temperamento , plus minusve periculosam quis non existimaverit ?

TRIA in fracturarum simplicium curationem præsertim veniunt , effracta scilicet adunare , adunata continere , contenta deniquè ab accidentibus servare ; triplici modo adimpletur adunatio , extensione nimirum , contra-extensione , & conformatione ; retentio & conservatio partium fracturarum , tum deligatione , tum sitû ritè adhibitis ; accidentia demùm artis auxilio haud infrequenter præcaveri possunt.

SI contrita fuerit ossis substantia ; si laniatæ fuerint carnosæ partes ; si sanguiferi tubi liquidum vitale profundant ; si Tumor adsit ; si intentissimus dolor ægrum exagitet ; si morosâ prurigine pars verminet ; si sæviant febris & inflammatio cum apostematis periculo ; si immineat gangrena ; si Nervorum vel resolutio , vel distentio secuta fuerit ; si demùm successerit Atrophia , vel Anchilosis ; tunc ritè sanari non poterit fractura nisi unicuique accidenti congrua subministrentur auxilia.

OSSIUM comminutioni , fragmentorum aut extractio , aut in statû naturali , pro re natâ , idonea repositio.

AD refarciendas Carnes , debellandaque plurima ex prædictis accidentia , fasciationem duodeviginti capitibus ordinatam ut prævalentem admittimus.

INFLAMMATIONI foci emollientes , phlebotomia ; Hemorrhagiæ compressio , ligatura nonnunquam & stiptica ; Dolori & Convulsioni legitima partium reductio , venæ sectiones ; Pruritu aquosæ & tantisper spirituosæ fomentationes ; Febri tenuis vitæ ratio , venæ sectiones ; Abscessui haud intempestivus purulenti liquaminis exitus ; Gangrenæ spirituosæ , scarificationes , incisiones ; Anchylosi , ut dicunt , imperfectæ , partis blandi frequenterque repetiti motus , balnea , diluentia ; Paralysi & Atrophie stimulantibus & calidæ frictiones , aquæ thermæ , &c. , occurrunt & adversantur.

Si, ingravescente malo, therapæiæ inanis prorsus evadat energia; si sphacelus Gangrenæ successerit; ad extrema recurrendum, pressiori que pede partis necrosi obviet Amputatio.

REMISSIS verò accidentibus, ne quid calli generationi obfit sedulò providendum; hoc pro ossis naturâ, volumine, substantiæ deperditione, ægri ætate temperamento, fracturæ sitû & figurâ, succorum indole, citiùs seriùs ve haud deforme ferruminabimur, si opportunè & ut par est appositus contentusque fuerit apparatus.

MIRAM autem calli fabricam succi ossis nutritiî ope, ad unius cujusque canaliculi extremum guttatim & circulatim depluentis, cum Neotericis efformari contendimus.

Has positiones, DEO JUVANTE, & præside M. FRANCISCO-MICHAELE DISDIER, Artium Liberalium & Chirurgiæ Magistro, tueri conabitur JOANNES SEREIS LASCURIENSIS, Artium Liberalium Magister.

PARISIIS;
IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.

Die Sabbati 13^a. Novembris à sesqui-secundâ post meridiem ad septimam. Anno Domini 1751.

PRO ACTU PUBLICO

Typis DELAGUETTE Regiæ Chirurg. Academiæ
Typographi 1751.